arXiv:alg-geom/9202024v1 21 Feb 1992

Sur la cohomologie de certains espaces de modules de fibrés vectoriels

Arnaud Beauville(*)

Dédié à M.S. Narasimhan et C.S. Seshadri,
pour leur 60ème anniversaire.

Soit X une surface de Riemann compacte. Fixons des entiers r et d *premiers entre eux*, avec $r \geq 1$, et notons $\mathcal{M}$ l'espace des modules $\mathcal{U}_{\mathrm{X}}(r,d)$ des fibrés vectoriels stables sur X, de rang r et de degré d. C'est une variété projective et lisse, et il existe un *fibré de Poincaré* $\mathcal{E}$ sur $\mathrm{X} \times \mathcal{M}$; cela signifie que pour tout point e de $\mathcal{M}$, correspondant à un fibré E sur X, la restriction de $\mathcal{E}$ à $\mathrm{X} \times \{e\}$ est isomorphe à E.

Notons p , q les projections de $\mathrm{X} \times \mathcal{M}$ sur X et $\mathcal{M}$ respectivement. Soit m un entier $\leq r$; la classe de Chern $c_m(\mathcal{E})$ admet une décomposition de Künneth

$$c_m(\mathcal{E}) = \sum_i p^*\xi_i \cdot q^*\mu_i \ , \quad \text{avec} \quad \xi_i \in \mathrm{H}^*(\mathrm{X},\mathbf{Z}) \ , \ \mu_i \in \mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Z}) \ , \quad \deg(\xi_i)+\deg(\mu_i) = 2m.$$

Nous dirons que les classes μ_i sont les composantes de Künneth de $c_m(\mathcal{E})$. Un des résultats essentiels de [A–B] est la détermination d'un ensemble de générateurs de l'algèbre de cohomologie $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Z})$; il a la conséquence suivante :

Théorème. — *L'algèbre de cohomologie* $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$ *est engendrée par les composantes de Künneth des classes de Chern de* $\mathcal{E}$.

Le but de cette note est de montrer comment la méthode de la diagonale utilisée dans [E–S] fournit une démonstration très simple de ce théorème. Celui-ci résulte de l'énoncé un peu plus général que voici :

Proposition. — *Soit* X *une variété complexe projective et lisse, et* $\mathcal{M}$ *un espace de modules de faisceaux stables sur* X *(par rapport à une polarisation fixée, cf.* [M]*). On fait les hypothèses suivantes :*

(i) La variété $\mathcal{M}$ *est projective et lisse.*

(ii) Il existe un faisceau de Poincaré $\mathcal{E}$ *sur* $\mathcal{M}$ *.*

(iii) Pour E , F *dans* $\mathcal{M}$, *on a* $\mathrm{Ext}^i(\mathrm{E},\mathrm{F}) = 0$ *pour* $i \geq 2$.

(*) Avec le support partiel du projet européen Science "Geometry of Algebraic Varieties", Contrat n° SCI-0398-C (A). adresse électronique : arnaud@matups.matups.fr

Alors l'algèbre de cohomologie $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$ *est engendrée par les composantes de Künneth des classes de Chern de* $\mathcal{E}$.

La démonstration suit de près celle du th. 1 de [E–S]. Rappelons-en l'idée fondamentale : soit δ la classe de cohomologie de la diagonale dans $\mathrm{H}^*(\mathcal{M}\times\mathcal{M},\mathbf{Q})$; notons p et q les deux projections de $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ sur $\mathcal{M}$. Soit $\delta=\sum_i p^*\mu_i\cdot q^*\nu_i$ la décomposition de Künneth de δ ; alors *l'espace* $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$ *est engendré par les* ν_i . En effet, pour toute classe λ dans $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$, on a

$$\lambda=q_*(\delta\cdot p^*\lambda)=\sum\deg(\lambda\cdot\mu_i)\nu_i \quad ,$$

d'où notre assertion. Il s'agit donc d'exprimer la classe δ en fonction des classes de Chern du fibré universel.

Notons p_1,p_2 les deux projections de $\mathrm{C}\times\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ sur $\mathrm{C}\times\mathcal{M}$, π la projection sur $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$; désignons par $\mathcal{H}$ le faisceau $\mathcal{H}om(p_1^*\mathcal{E},p_2^*\mathcal{E})$. Vu l'hypothèse (iii), l'hypercohomologie $\mathrm{R}\pi_*\mathcal{H}$ est représentée dans la catégorie dérivée par un complexe de fibrés $\mathrm{K}^\bullet$, nul en degré différent de 0 et 1 . Autrement dit, il existe un morphisme de fibrés $u:\mathrm{K}^0\longrightarrow\mathrm{K}^1$ tel qu'on ait, pour tout point $x=(\mathrm{E},\mathrm{F})$ de $\mathcal{M}$, une suite exacte

$$0\to\mathrm{Hom}(\mathrm{E},\mathrm{F})\longrightarrow\mathrm{K}^0(x)\xrightarrow{u(x)}\mathrm{K}^1(x)\longrightarrow\mathrm{Ext}^1(\mathrm{E},\mathrm{F})\to 0 \quad .$$

Comme l'espace $\mathrm{Hom}(\mathrm{E},\mathrm{F})$ est non nul si et seulement si E et F sont isomorphes, on voit que la diagonale Δ de $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ coïncide ensemblistement avec le lieu de dégénérescence D de u (défini par l'annulation des mineurs de rang maximal de u). On peut prouver comme dans [E–S] l'égalité schématique, mais cela n'est pas nécessaire pour démontrer la proposition.

Soit E un élément de $\mathcal{M}$. On a

$$\mathrm{rg}(\mathrm{K}^0)-\mathrm{rg}(\mathrm{K}^1)=\dim\,\mathrm{Hom}(\mathrm{E},\mathrm{F})\;-\;\dim\,\mathrm{Ext}^1(\mathrm{E},\mathrm{F})$$

quel que soit le point (E,F) de $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$. Puisque $\mathrm{Ext}^2(\mathrm{E},\mathrm{E})=0$, la dimension m de $\mathcal{M}$ est égale à $\dim\,\mathrm{Ext}^1(\mathrm{E},\mathrm{E})$; ainsi la sous-variété déterminantale D de $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ a la codimension attendue $\mathrm{rg}(\mathrm{K}^1)-\mathrm{rg}(\mathrm{K}^0)+1$. Sa classe de cohomologie $\delta'\in\mathrm{H}^m(\mathcal{M}\times\mathcal{M},\mathbf{Z})$ est alors donnée par la formule de Porteous

$$\delta'=c_m(\mathrm{K}^1-\mathrm{K}^0)=c_m(-\pi_!\mathcal{H}) \ ,$$

où $\pi_!$ désigne le foncteur image directe en K-théorie. Cette classe étant multiple de la classe δ de la diagonale, on conclut avec le lemme suivant :

Lemme. — *Soit* $\mathcal{A}$ *la sous-* $\mathbf{Q}$ *-algèbre de* $\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$ *engendrée par les composantes de Künneth des classes de Chern de* $\mathcal{E}$ *, et soient* p *et* q *les deux projections de* $\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ *sur* $\mathcal{M}$ *. Les classes de Chern de* $\pi_!\mathcal{H}$ *sont de la forme* $\sum p^*\mu_i\cdot q^*\nu_i$ *, avec* μ_i *,* $\nu_i\in\mathcal{A}$*.*

Notons r la projection de $\mathrm{C}\times\mathcal{M}\times\mathcal{M}$ sur C . Tout polynôme en les classes de Chern de $p_1^*\mathcal{E}$ et de $p_2^*\mathcal{E}$ est une somme de produits de la forme $r^*\gamma\cdot\pi^*p^*\mu\cdot\pi^*q^*\nu$, où μ et ν appartiennent à $\mathcal{A}$. Le lemme résulte alors de la formule de Riemann-Roch

$$ch(\pi_!\mathcal{H})=\pi_*\big(r^*\mathrm{Todd}(\mathrm{C})\,\mathrm{ch}(\mathcal{H})\big)\quad . \quad\blacksquare$$

Remarque.– La condition (iii) de la proposition est évidemment très contraignante. Donnons deux exemples :

a) X est une surface rationnelle ou réglée, et la polarisation H vérifie $\mathrm{H}\cdot\mathrm{K_X}<0$. L'argument de [M, cor. 6.7.3] montre que la condition (iii) est satisfaite. Si de plus les coefficients a_i du polynôme de Hilbert des éléments de $\mathcal{M}$, écrit sous la forme $\chi(\mathrm{E}\otimes\mathrm{H}^m)=\sum_{i=0}^{2}a_i\binom{m+i}{i}$, sont premiers entre eux, les conditions (i) à (iii) sont satisfaites [M, § 6].

Dans le cas d'une surface *rationnelle*, on obtient mieux. Pour toute variété T , désignons par $\mathrm{CH}^*(\mathrm{T})$ l'anneau de Chow de T ; grâce à l'isomorphisme $\mathrm{CH}^*(\mathrm{X}\times\mathcal{M})\cong\mathrm{CH}^*(\mathrm{X})\otimes\mathrm{CH}^*(\mathcal{M})$, on peut remplacer dans la démonstration de la proposition l'anneau de cohomologie par l'anneau de Chow. On en déduit que *la cohomologie rationnelle de* $\mathcal{M}$ *est algébrique,* c'est-à-dire que l'application "classe de cycles" $\mathrm{CH}^*(\mathcal{M})\otimes\mathbf{Q}\longrightarrow\mathrm{H}^*(\mathcal{M},\mathbf{Q})$ est un isomorphisme d'anneaux. Dans le cas $\mathrm{X}=\mathbf{P}^2$, Ellingsrud et Strømme obtiennent le même résultat *sur* $\mathbf{Z}$, plus le fait que ces groupes sont sans torsion, grâce à l'outil supplémentaire de la suite spectrale de Beilinson.

b) X est une variété de Fano de dimension 3 . Soit S une surface lisse appartenant au système linéaire $|-\mathrm{K_X}|$ (de sorte que S est une surface K3). Lorsqu'elle est satisfaite, la condition (iii) a des conséquences remarquables [T] : elle entraîne que l'application de restriction $\mathrm{E}\longmapsto\mathrm{E}_{|\mathrm{S}}$ définit un isomorphisme de $\mathcal{M}$ sur une *sous-variété lagrangienne* d'un espace de modules $\mathcal{M}_\mathrm{S}$ de fibrés sur S (muni de sa structure symplectique canonique). Il me semble intéressant de mettre en évidence des espaces de modules de fibrés sur une variété de Fano (et déjà sur $\mathbf{P}^3$) possédant la propriété (iii).

BIBLIOGRAPHIE

[A–B] M. Atiyah et R. Bott : *The Yang-Mills equations over Riemann surfaces.* Phil. Trans. R. Soc. London A 308, 523-615 (1982).

[E–S] G. Ellingsrud et S.A. Strømme : *On generators for the Chow ring of fine moduli spaces on* $\mathbf{P}^2$. Preprint (1989).

[M] M. Maruyama : *Moduli of stable sheaves, II.* J. Math. Kyoto Univ. 18 (1978), 557-614.

[T] A. N. Tyurin : *The moduli space of vector bundles on threefolds, surfaces and curves I.* Preprint (1990).

Arnaud Beauville
Université Paris-Sud
Mathématiques – Bât. 425
91 405 Orsay Cedex, France